

ACTRICE

Denise x Agata




Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Vroege rijptijd
- Hoge opbrengst
- Uniforme partij
- Heldere schil
- Goede droogte resistentie



Eigenschappen

Mark	Tafelaardappel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Vroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Rond ovaal
Knolaantal	9-11
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Tamelijk vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Midden lange kiemrust
Opkomst	Traag
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Gevoelig
Droge stof gehalte	18,5 %
Onderwatergewicht	335
Droogte resistentie	7



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	58.000	23 cm
35/45	44.500	30 cm
45/55	39.000	34 cm
35/55	41.500	32 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	3,5
Phytophthora knol	5
Gewone schurft	6,5
Y-virus	8
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 160 kg N/ha. inclusief bodemvoorraad. Bij voorkeur geen overbemesting.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali: Lage dosering, 200 kg K₂O/ha. $\frac{3}{4}$ van de dosering 3 maanden voor het poten. $\frac{1}{4}$ na de knolzetting.
- Patentkali wordt aanbevolen.
- Extra borium helpt om de calcium hoeveelheid in de knol te verhogen. Dit verbetert de schil kwaliteit.





Denise x Agata

Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen is niet aan te bevelen, Actrice kunt u planten in het witte puntjes stadium.
- Tijdens poten een behandeling met Rhizoctonia bestrijdende middelen wordt aanbevolen.
- Bij lange bewaring is een behandeling tegen zilverschurft aan te raden.
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden, zorg voor een goede grond structuur.
- Actrice is gevoelig voor een tekort aan spoorelementen. Daarom is het aan te raden om borium en calcium mee te geven, voor een sterkere schil.



Aandachtspunten teelt

- Actrice heeft een trage groeistart, gevolgd tot een goede loofontwikkeling. Met een midden hoge plant en een goede dekking.
- Pas de bemesting aan om een voldoende afgerijpt gewas te bereiken tijdens het doodmaken.
- Stikstof gebruik is 80% in vergelijking met andere vroege rassen.
- Actrice is tamelijk vatbaar voor Phytophthora in het loof maar door de vroege afrijping hoeft dit geen probleem te geven, maar een behandeling is noodzakelijk.
- Gebruik van Sencor is niet aan te bevelen.
- Actrice groeit ook zeer goed op zand gronden.
- De knollen groeien dichtbij de moederknol.



Loofdoding en oogst

- Knollen groeien in loofvernietigingsperiode na een trage start snel grof.
- Zorg voor een goed afgerijpt gewas bij de loofdoding.
- Actrice is gevoelig voor mechanische beschadigingen.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Rooi met zorg om beschadigingen te voorkomen.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Voor een lange bewaring is mechanische koeling vereist.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.