




### Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Goede hitte tolerantie
- Multifunctioneel ras
- Geschikt voor verwerking tot frites



### Eigenschappen

Mark	Tafelaardappel & Frites
Kooktype	BC (redelijk vastkokend/melig)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	8-10
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Weinig bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Onderwatergewicht	390
Droogte resistentie	7



### Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	50.000	27 cm
35/55	42.000	32 cm
Frites		
28/35	58.000	23 cm
35/50	47.500	30 cm
50/55	37.000	38 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



### Resistenties

Phytophthora loof	5,5
Phytophthora knol	8
Gewone schurft	5
Y-virus	7
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	-
Fysio 1	Vatbaar



### Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 220 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 giften.





## Quarta x Semlo

### Voorbehandeling en poten

- Agria tijdig voor het planten uit de koeling halen en op temperatuur laten komen.
- Voorkiemen is niet noodzakelijk, poten in het witte puntjesstadium heeft de voorkeur.
- Het is niet aan te raden om te telen op schurft gevoelige gronden.
- De beste resultaten worden verkregen op gronden met een goede bodemstructuur.



### Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Stikstof bij voorkeur in meerdere giften.
- Agria is weinig gevoelig voor Sencor.
- Agria is gevoelig voor schurft, irrigatie tijdens groeiseizoen vermindert de kans op schurft.



### Loofdoding en oogst

- De knollen voor de oogst goed laten afharderen en met zorg rooien.
- Agria is erg gevoelig voor rooibeschatiging.
- De moederknollen moeten verdwenen zijn op het moment van oogsten.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken om mechanische beschadiging en stootblauw te voorkomen.



### Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Product zo snel mogelijk drogen, bij voorkeur met een kachel.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Agria is geschikt voor de lange bewaring.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.