


BARTINA

Saturna x ZPC 62-75



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Grof groeiend
- Goede droogte en hitte tolerantie
- Zeer uniform

Eigenschappen

Mark	Traditioneel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Zeer grof
Knolvorm	Rond ovaal
Knolaantal	9-11
Schilkleur	Rood
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Tamelijk vlakogig
Bessen	Weinig bessen
Kiemrust	Midden Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Niet gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	18,5 %
Onderwatergewicht	336
Droogte resistentie	8



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	58.000	23 cm
35/55	40.000	33 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.

Resistenties

Phytophthora loof	6
Phytophthora knol	6
Gewone schurft	5
Y-virus	7
Poeder schurft	Weinig vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Tolerant
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Vatbaar
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent

Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 200 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standard advies.
- Kali volgens standaard advies.



Saturna x ZPC 62-75

Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- De kiemrust is midden lang, voorkiemen kan de teelt vervroegen
- Het is niet aan te raden om Bartina te telen op schurft gevoelige gronden.
- De beste resultaten worden verkregen op lichtere gronden met een goede bodemstructuur.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia en zilverschurft wordt aanbevolen.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is tamelijk traag, gevolgd door een goed ontwikkelend en dekkend gewas.
- Het gebruik van Sencor is aan te bevelen voor opkomst. Na opkomst graag het lage doseringssysteem gebruiken.
- Bartina is gevoelig voor schurft, irrigatie tijdens groeiseizoen vermindert de kans op schurft.



Loofdoding en oogst

- De knollen voor oogst goed laten afharden.
- Bartina is zeer gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Bartina is niet geschikt voor de lange bewaring.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.