



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Middenvroege rijptijd
- Wasbaar
- Heldere gele schil
- Hoge opbrengst
- Goede smaak



Eigenschappen

Mark	Tafelaardappel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Middenvroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Rond ovaal
Knolaantal	11-13
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Tamelijk vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Midden lange kiemrust
Opkomst	Goed
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	18,5%
Onderwatergewicht	335
Droogte resistentie	7



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	53.500	25 cm
35/55	40.000	33 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	4
Phytophthora knol	6
Gewone schurft	7
Y-virus	8
Poeder schurft	Niet vatbaar
Kringerigheid	Niet vatbaar
Yntn knoltolerantie	Tolerant
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 200 kg N/ha. Bemesting in meerdere giften
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies.





Actrice x Satina

Voorbehandeling en poten

- Bernice heeft een midden lange kiemrust.
- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen is niet aan te raden, dit ras kan goed worden geplant in het witte puntjes stadium.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia wordt aanbevolen.
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden, zorg voor een goede grond structuur.
- Bij lange bewaring wordt een behandeling tegen zilverschurft aangeraden.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkeld gewas.
- De zetting is vroeg.
- Bernice heeft een goede droogte resistentie.
- Stikstof bij voorkeur in meerdere giften.
- Bernice is gevoelig voor Sencor.
- Bernice is weinig vatbaar voor mechanische beschadiging en stootblauw.



Loofdoding en oogst

- Oogst met zorg om beschadiging te voorkomen.
- De knollen voor oogst goed laten afharden.
- Probeer de valhoogtes te beperken en voorkom mechanische beschadiging en stootblauw.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Bij een lange bewaring is mechanische koeling aan te raden.
- Ventileer regelmatig om CO2 ophoping te voorkomen.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.