



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Goede droogte - en hitte resistentie
- Grote knollen
- Hoge opbrengst



Eigenschappen

Mark	Traditioneel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Zeer hoog
Grofheid	Zeer grof
Knolvorm	Rond ovaal
Knolaantal	6-8
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Crème
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Tamelijk vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Midden lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig Gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	19,7 %
Onderwatergewicht	352
Droogte resistentie	8



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	58.000	23 cm
35/55	45.000	30 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren..



Resistenties

Phytophthora loof	7
Phytophthora knol	7
Gewone schurft	6
Y-virus	7
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Vatbaar
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 200 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 doses.





Ulster Glade x A25/19

Voorbehandeling en poten

- Een warmte stoot kan helpen om alle ogen goed los te krijgen, dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen is niet aan te bevelen, Cara kunt u planten in het witte puntjes stadium.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia en zilverschurft wordt aanbevolen.



Aandachtspunten teelt

- Cara heeft een trage groeistart gevolgd door een goede loofontwikkeling met een midden hoge plant en een goede dekking.
- Cara is gevoelig voor Sencor.
- Preventieve bespuiting tegen Phytophthora wordt aanbevolen.
- Knolaantal is tamelijk laag, knollen groeien snel grof.
- Cara kan op alle grondsoorten worden geteeld.



Loofdoding en oogst

- De knollen voor oogst goed laten afharden voor een beter huidvastheid.
- Cara is weinig gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Cara heeft een midden lange kiemrust.
- Bij een lange bewaring is mechanische koeling aan te raden.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.