




Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Gladde diep rode schil
- Zeer uniform
- Hoge opbrengst
- Goede Phytophthora resistentie



Eigenschappen

Mark	Tafelaardappel & Traditioneel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	10-12
Schilkleur	Rood
Vleeskleur	Geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Niet gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	18,5 %
Onderwatergewicht	335
Droogte resistentie	8



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	55.000	24 cm
35/55	40.000	33 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	8
Phytophthora knol	6
Gewone schurft	6
Y-virus	6,5
Poeder schurft	Niet vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 160 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standard advies.
- Kali volgens standaard advies.





Laura x Bellini

Voorbehandeling en poten

- Een warmte stoot kan helpen om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Zorg dat het pootgoed goed is geacclimatiseerd voor het planten.
- Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Cereza geeft het beste resultaat op de lichtere klei gronden met een goede bodemstructuur.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia en zilverschurft wordt aanbevolen.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Het gebruik van Sencor is aan te bevelen voor opkomst. Na opkomst graag het lage doseringssysteem gebruiken.
- Stikstof gebruik is 70 - 80% in vergelijking met andere rassen.
- Dit ras is een beetje gevoelig voor virus, wat later in het seizoen zichtbaar is.
- Geen extra Stikstof gift laat in het groeiseizoen geven, om het gewas natuurlijk te laten afrijpen.



Loofdoding en oogst

- Graag zorg dragen voor een goede en natuurlijke loofvernietiging.
- De knollen voor oogst goed laten afharden voor een betere huidvastheid.
- Cereza is weinig gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Bij een lange bewaring is mechanische koeling aan te raden.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.