


FRIESLANDER

Gloria x 74 A3



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Heel vroeg
- Goede smaak
- Wasbaar
- Geschikt voor frites



Eigenschappen

Mark	Tafelaardappel & Vroege frites
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Heel vroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Ovaal
Knolaantal	8-10
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Tamelijk vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Midden lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Matig
Blauw gevoeligheid	Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	Niet gevoelig
Droge stof gehalte	20,2 %
Onderwatergewicht	370
Droogte resistentie	5



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	58.000	23 cm
35/55	44.500	30 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	4
Phytophthora knol	6
Gewone schurft	7
Y-virus	7
Poeder schurft	-
Kringerigheid	Niet vatbaar
Yntn knoltolerantie	-
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 240kg N/ha. inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 doses.





Gloria x 74 A3

Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Tijdens poten een behandeling met Rhizoctonia bestrijdende middelen wordt aanbevolen
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden.
- Plant het pootgoed op maaiveld niveau, als de grondtemperatuur warm genoeg met een goede grond structuur.



Aandachtspunten teelt.

- Knolzetting is vroeg.
- Gebruik van Sencor is niet aan te bevelen, Ook niet voor opkomst.
- Preventieve Phytophthora bespuitingen zijn aan te raden.



Loofdoding en oogst

- Zorg voor een goed afgerijpt gewas bij de loofdoding.
- Frieslander is gevoelig voor mechanische beschadigingen.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Rooi met zorg om beschadigingen te voorkomen.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Voor een lange bewaring is mechanische koeling vereist.
- Frieslander heeft een midden lange kiemrust.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.