



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Geschikt voor chips
- Goede bewaarbaarheid



Eigenschappen

Mark	Chips
Kooktype	C (melig)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Rond ovaal
Knolaantal	8-10
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	22,9%
Onderwatergewicht	425
Droogte resistentie	8



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	55.000	24 cm
35/55	45.000	30 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	5
Phytophthora knol	8
Gewone schurft	7
Y-virus	8
Poeder schurft	Weinig vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Susceptible
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 200 kg N/ha inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 giften.





DDR 5158 x sw 163/55

Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen is niet aan te raden, dit ras kan goed worden geplant in het witte puntjes stadium.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia wordt aanbevolen
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden, zorg voor een goede grond structuur, vooral op de zwaardere gronden.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Het gebruik van Sencor wordt voor opkomst aangeraden. Bij gebruik na opkomst, het lage dosering systeem gebruiken.
- Stikstof in meerdere giften in aan te raden, om teveel loofgroei bij de start te vermijden.
- Hermes heeft een goede droogte en hitte resistentie.



Loofdoding en oogst

- De knollen voor oogst goed laten afharden voor een betere huidvastheid.
- Rooi met zorg om rooibeschatiging te voorkomen.
- Hermes is gevoelig voor stootblauw.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Start onmiddellijk met drogen na het rooien om condensatie te voorkomen.
- Temperatuur verschillen in combinatie met condensatie resulteert in vroeg kieming en een verhoogd risico op zilverschorft.
- Hermes is geschikt voor de lange bewaring



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.