



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Vroege afrijping
- Vroege knolzetting
- Grote knollen
- Goed onderwatergewicht



Eigenschappen

Mark	Traditioneel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Vroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Rond ovaal
Knolaantal	6-8
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Tamelijk vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Niet gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stof gehalte	19,3 %
Onderwatergewicht	352
Droogte resistentie	7



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	58.000	23 cm
35/55	45.000	30 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	7,5
Gewone schurft	6
Y-virus	6
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Vatbaar
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 240kg N/ha. inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 doses.





Sirtema x MPI 19268

Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot is niet nodig.
- Afspruiten verhoogt het risico op onderzeeërs.
- Niet poten in koude gronden. Dit heeft onregelmatige opkomst tot gevolg.
- Plant het pootgoed op maaiveld niveau, als de grondtemperatuur warm genoeg met een goede grond structuur.



Aandachtspunten teelt.

- De knolzetting is vroeg.
- Jaerla is heel gevoelig voor Sencor.
- Preventieve Phytophthora bespuitingen zijn aan te raden.
- Knolaantal is laag, knollen groeien snel grof.



Loofdoding en oogst

- Zorg voor een goed afgerijpt gewas bij de loofdoding.
- Jaerla is gevoelig voor mechanische beschadigingen.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Rooi met zorg om beschadigingen te voorkomen.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Voor een lange bewaring is mechanische koeling vereist.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie