




Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Gladde rode schil
- Zeer uniform
- Hoge opbrengst
- Goede schurfft resistentie



Eigenschappen

Mark	Tafel aardappel & Traditioneel
Kooktype	A (vastkokend)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	10-12
Schilkleur	Rood
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	17,8 %
Onderwatergewicht	320
Droogte resistentie	7



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	55.000	24 cm
35/55	41.500	32 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	5 (in onderzoek)
Phytophthora knol	6 (in onderzoek)
Gewone schurfft	8
Y-virus	8 (in onderzoek)
Poeder schurfft	Niet vatbaar
Kringerigheid	Niet vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Resistent
Ro 2,3	Resistent
Pa 2	7
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 200 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad. Bij voorkeur in 2 doses.
- Fosfaat volgens standard advies.
- Kali volgens standaard advies.





FOB 04-136-108R x FOB 05-140-008R

Voorbehandeling en poten

- Een warmte stoot kan helpen om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Zorg dat het pootgoed goed is geacclimatiseerd voor het planten.
- Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia en zilverschurft wordt aanbevolen.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Stikstof gift in meerdere doses is aan te raden.
- Het gebruik van Sencor is aan te bevelen voor opkomst. Na opkomst graag het lage doseringssysteem gebruiken.



Loofdoding en oogst

- Graag zorg dragen voor een goede en natuurlijke loofvernietiging.
- De knollen voor oogst goed laten afharden.
- Kyra is weinig gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Bij een lange bewaring is mechanische koeling vereist.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.