

# MARIS BARD

Y15/139 x Ulster Prince




## Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Uniforme maat
- Vroege rijptijd

## Eigenschappen

Mark	Traditioneel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Midden vroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	11-13
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Wit
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Midden lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stof gehalte	19,0 %
Onderwatergewicht	345
Droogte resistentie	8



## Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	55.000	24 cm
35/55	40.000	33 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.

## Resistenties

Phytophthora loof	4
Phytophthora knol	6
Gewone schurft	5
Y-virus	6
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Weinig vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Vatbaar
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent

## Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 220kg N/ha. inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 doses.



## Y15/139 x Ulster Prince

### Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen, dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen is niet aan te raden, dit ras kan goed worden geplant in het witte puntjes stadium.
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden tot 25% klei grond. Zorg voor een goede grond structuur.



### Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Maris Bard is gevoelig voor Sencor.
- Een vroege stikstof gift is aan te raden.



### Loofdoding en oogst

- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken om mechanische beschadiging en stootblauw te voorkomen.



### Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Voor een lange bewaring is mechanische koeling vereist.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.