




### Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Geschikt voor frites
- Goede hitte en droogte tolerantie
- Uitstekende droge stofgehalte



### Eigenschappen

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Mark                | Traditioneel/ frites               |
| Kooktype            | BC (redelijk vastkokend tot melig) |
| Rijptijd            | Midden laat                        |
| Opbrengst           | Zeer hoog                          |
| Grofheid            | Grof                               |
| Knolvorm            | Lang ovaal                         |
| Knolaantal          | 12-14                              |
| Schilkleur          | Geel                               |
| Vleeskleur          | Licht geel                         |
| Vleeskleur na koken | Geen verkleuring                   |
| Vlakheid van ogen   | Tamelijk vlakogig                  |
| Bessen              | Geen bessen                        |
| Kiemrust            | Midden lange kiemrust              |
| Opkomst             | Normaal                            |
| Sencor gevoeligheid | Niet gevoelig                      |
| Loofontwikkeling    | Goed                               |
| Blauw gevoeligheid  | Weinig gevoelig                    |
| Onderzeeërvorming   | Weinig gevoelig                    |
| Droge stofgehalte   | 22,2 %                             |
| Onderwatergewicht   | 410                                |
| Droogte resistentie | 7                                  |



### Plantafstanden

|              |                  |         |
|--------------|------------------|---------|
| Plantdiepte  | Normaal          |         |
| Plantafstand | Rijafstand 75 cm |         |
| Maat         | Planten/ha       | Afstand |
| 28/35        | 58.000           | 23 cm   |
| 35/55        | 40.000           | 33 cm   |

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



### Resistenties

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Phytophthora loof   | 5              |
| Phytophthora knol   | 6              |
| Gewone schurft      | 6              |
| Y-virus             | 6,5            |
| Poeder schurft      | Weinig vatbaar |
| Kringerigheid       | Weinig vatbaar |
| Yntn knoltolerantie | Tolerant       |
| AM resistenties     | -              |
| Ro1 & Ro4           | Vatbaar        |
| Wratziekte          | -              |
| Fysio 1             | Resistent      |



### Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodem analyse.
- Stikstof: 240 kg N/ha in 2 doseringen. Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 giften.
- Extra borium helpt om de calcium hoeveelheid in de knol te verhogen. Dit verbetert de schil kwaliteit.





## Mondial x Felsina

### Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen kan positief uitpakken. De start is sneller en de groeiperiode korter.
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden.



### Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Metro heeft een goede hitte resistentie.
- Een gedeelde stikstof gift is aan te bevelen.
- Metro is niet gevoelig voor het gebruik van Sencor.



### Loofdoding en oogst

- Rooi met zorg om rooibeschatiging te voorkomen.
- Metro is weinig gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.
- De knollen voor oogst goed laten afharden.



### Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: Zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Metro is geschikt voor de lange bewaring.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.