


MONALISA

Bierma A1-287 X Colmo



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Aantrekkelijke heldere huid
- Uniforme knollen
- Geschikt voor lange bewaring



Eigenschappen

Mark	Tafelaardappel
Kooktype	AB (redelijk vastkokend)
Rijptijd	Middenvroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Ovaal
Knolaantal	10-12
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Licht Geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig Gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	19,0 %
Onderwatergewicht	345
Droogte resistentie	6



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal
Plantafstand	Rijafstand 75 cm

Size	Planten/ha	Planten/ha
28/35	60.000	22 cm
35/45	53.000	25 cm
45/50	45.000	30 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



Resistenties

Phytophthora loof	4
Phytophthora knol	6
Gewone schurft	5
Y-virus	8
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Niet vatbaar
Yntn knoltolerantie	Gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Vatbaar
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 220 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 giften.





Bierma A1-287 X Colmo

Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- In het witte puntjes stadium poten is goed mogelijk. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia wordt aanbevolen.
- Bij lange bewaring wordt een behandeling tegen zilverschurft aangeraden.
- Geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden tot 25% klei grond. Zorg voor een goede grond structuur.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een redelijk ontwikkeld gewas.
- Stikstof bij voorkeur in meerdere giften.
- Het gebruik van Sencor is aan te bevelen voor opkomst. Na opkomst graag het lage doseringssysteem gebruiken.
- Irrigatie draagt bij aan een regelmatige groei en voorkomt schurft aantasting tijdens de knolzetting.



Loofdoding en oogst

- De knollen voor oogst goed af laten harden.
- Met zorg oogsten om mechanische beschadiging te voorkomen.
- Monalisa is iets gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Monalisa heeft een lange kiemrust, en dus te gebruiken voor de lange bewaring.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.