


### Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Vroeg
- Geschikt voor verwerking tot frites
- Goede smaak
- Zeer goed onderwatergewicht



### Eigenschappen

Mark	Frites
Kooktype	BC (redelijk vastkokend tot melig)
Rijptijd	Vroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Rond ovaal
Knolaantal	8-10
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Tamelijk vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Korte kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Gevoelig
Drogestofgehalte	20,7%
Onderwatergewicht	380
Droogte resistentie	6



### Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	50.000	27 cm
35/55	41.500	32 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren.



### Resistenties

Phytophthora loof	4,5
Phytophthora knol	6
Gewone schurft	5
Y-virus	6
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Niet vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	-
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	-
Fysio 1	Resistent



### Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 200 kg N/ha in 2 giften. Inclusief bodemvoorraad.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 giften.





## Civa x Provita

### Voorbehandeling en poten

- Premiere heeft een kort kiemrust.
- Een wamtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen, dit kan de teelt vervroegen.
- Tijdens het poten een behandeling met Rhizoctinia bestrijdende middelen wordt aanbevolen.



### Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Premiere is gevoelig voor Sencor.
- Bespuiting tegen Phtytophthora wordt aangeraden.
- Knolaantal is laag, knollen groeien makkelijk grof.



### Loofdoding en oogst

- De knollen voor de oogst goed laten afharderen voor een betere huidvastheid.
- Premiers kan direct na de oogst verwerkt worden.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken om mechanische beschadiging en stootblauw te voorkomen.



### Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Premiere heeft een korte kiemrust en is niet geschikt voor de lange bewaring.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie.