


Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Middenlaat
- Hoge opbrengst
- Heldere schil
- Uniforme long oval knollen
- Lange kiemrust



Eigenschappen

Mark	Tafelaardappel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	11-13
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Crème
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Sterk
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Niet gevoelig
Droge stof gehalte	19,2 %
Onderwatergewicht	350
Droogte resistentie	7,5



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	55.000	24 cm
35/55	40.000	32 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren..



Resistenties

Phytophthora loof	5,5
Phytophthora knol	7
Gewone schurft	6
Y-virus	5,5
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Niet gevoelig
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 210 kg N/ha. inclusief bodemvoorraad.
Bij voorkeur in 2 doses
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies. Bij voorkeur in 2 doses.





FABULA x CARRERA

Voorbehandeling en poten

- Een warmtestoot helpt om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Tijdens poten een behandeling met Rhizoctonia bestrijdende middelen wordt aanbevolen.
- Armin is geschikt voor de teelt op zowel lichte als zware gronden, zorg voor een goede grond structuur.
- Voldoende aandacht aan de rug opbouw besteden, om groene knollen te vermijden.
- Niet op schurft gevoelige gronden telen.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Irrigatie kan het aantal knollen per plant verhogen en schurft voorkomen
- Armin heeft een goede hitte en droogte resistentie.
- Stikstof in meerdere doses wordt aangeraden. 65% voor het planten en 35% na de knolzetting.
- Gebruik van Sencor is niet aan te bevelen. Abalone is gevoelig voor Metribuzin. Het kan schade aan het gewas veroorzaken.



Loofdoding en oogst

- De knollen moeten goed huidvast zijn voor het rooien.
- Armin is weinig gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Rooi met zorg om beschadigingen te voorkomen.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Na de wondheling en droging, langzaam de temperatuur naar 5-7 graden brengen.
- Voor een lange bewaring is mechanische koeling vereist.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie..