


Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Goede hitte en droogte resistentie
- Lage stikstof behoefte
- "Multipurpose" ras
- Goede bakkwaliteit



Eigenschappen

Mark	Traditioneel & Frites
Kooktype	BC (redelijk vastkokend/melig)
Rijptijd	Midden laat
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	10-12
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Onderwatergewicht	370
Droogte resistentie	7,5



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	58.000	23 cm
35/55	47.500	30 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren..



Resistenties

Phytophthora loof	6
Phytophthora knol	6
Gewone schurft	5,5
Y-virus	6,5
Poeder schurft	Vatbaar
Kringerigheid	Niet vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 160 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad. In 2 doseringen.
- Fosfaat volgens standaard advies.
- Kali volgens standaard advies.





Everest x Labadia

Voorbehandeling en poten

- Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Vermijdt gronden die gevoelig voor schurft zijn.
- Hind is geschikt voor elk grondtype, zorg voor een goede grond structuur.
- Een knol/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia en zilverschurft wordt aanbevolen.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkeld gewas..
- Stikstof gebruik is 70 - 80% in vergelijking met andere rassen.
- Hind is gevoelig voor Metribuzin.
- Hind is gevoelig voor schurft, irrigatie tijdens het groeiseizoen kan de kans op infectie van schurft verminderen.
- Hou een strak schema in uw phytophthora bestrijding.



Loofdoding en oogst

- De knollen voor de oogst goed laten afharden en met zorg rooien.
- Valhoogtes beperken i.v.m. rooibeschatiging.



Bewaring

- Zorg voor goede droging en wondheling direct na de oogst.
- Het product zo snel mogelijk drogen na de oogst. Een kachel wordt aangeraden.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- In de mechanische koeling lang te bewaren



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie..