



### Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Hoge opbrengst
- Lange kiemrust
- Goede hitte en droogte resistentie
- Goede smaak
- Heldere schil



### Eigenschappen

Mark	Tafel aardappel & traditioneel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Vroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Ovaal
Knolaantal	11-15
Schilkleur	Rood
Vleeskleur	Licht geel
Vleeskleur na koken	Geen verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Enkele bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	Goed
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	19,2 %
Onderwatergewicht	350
Droogte resistentie	7



### Plantafstanden

Plantdiepte		Normaal
Plantafstand		Rijafstand 75 cm
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	60.000	22 cm
35/55	47.500	28 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren..



### Resistenties

Phytophthora loof	6
Phytophthora knol	6,5
Gewone schurft	5,5
Y-virus	6,5
Poeder schurft	Weinig vatbaar
Kringerigheid	Niet vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	
Ro1, Ro4, Ro5	Resistent
Wratziekte	
Fysio 1	Resistent



### Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 190 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad. Bij voorkeur in 2 doses.
- Fosfaat volgens standard advies.
- Kali volgens standaard advies.





## Inova x Amadeus

### Voorbehandeling en poten

- Een warmte stoot kan helpen om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel wordt aanbevolen.



### Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Stikstof gift in meerdere doses is aan te raden.
- Het gebruik van Sencor is aan te bevelen voor opkomst. Na opkomst graag het lage doseringssysteem gebruiken.



### Loofdoding en oogst

- Graag zorg dragen voor een goede en natuurlijke loofvernietiging.
- De knollen voor oogst goed laten afharden.
- Red Sun is weinig gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



### Bewaring

- Start direct met drogen na de oogst, om condensatie te vermijden.
- Zorg voor goede droging en wondheling.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Red Sun kan langdurig worden bewaard bij een temperatuur van 6 graden.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie..