



Algemeen teeltadvies consumptieteelt

- Vroeg
- Grote knollen
- Witte vleeskleur
- Sterk looftype
- Lange kiemrust



Eigenschappen

Mark	Tafel aardappel & traditioneel
Kooktype	AB (vrij vastkokend)
Rijptijd	Vroeg
Opbrengst	Hoog
Grofheid	Grof
Knolvorm	Lang ovaal
Knolaantal	8-11
Schilkleur	Rood
Vleeskleur	Creme
Vleeskleur na koken	Lichte verkleuring
Vlakheid van ogen	Vlakogig
Bessen	Geen bessen
Kiemrust	Lange kiemrust
Opkomst	Normaal
Sencor gevoeligheid	Weinig gevoelig
Loofontwikkeling	Sterk
Blauw gevoeligheid	Weinig gevoelig
Onderzeeërvorming	Weinig gevoelig
Droge stofgehalte	18,7 %
Onderwatergewicht	340
Droogte resistentie	7



Plantafstanden

Plantdiepte	Normaal	
Plantafstand	Rijafstand 75 cm	
Maat	Planten/ha	Afstand
28/35	55.000	24 cm
35/55	41.500	32 cm

Afhankelijk van het teeltdoel.

Wij raden u aan altijd het knolaantal te controleren..



Resistenties

Phytophthora loof	4
Phytophthora knol	7
Gewone schurft	5,5
Y-virus	6
Poeder schurft	Niet vatbaar
Kringerigheid	Vatbaar
Yntn knoltolerantie	Weinig gevoelig
AM resistenties	
Ro1 & Ro4	Resistent
Wratziekte	
Fysio 1	Resistent



Bemesting

- Pas de bemesting aan, aan de hand van de bodemanalyse.
- Stikstof: 200 kg N/ha. Inclusief bodemvoorraad. Bij voorkeur in 2 doses.
- Fosfaat volgens standard advies.
- Kali volgens standaard advies.





FOB 02-136-66R x Red Valentine

Voorbehandeling en poten

- Een warmte stoot kan helpen om alle ogen goed los te krijgen dit kan de teelt vervroegen.
- Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Een knol en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia en zilverschurft wordt aanbevolen.



Aandachtspunten teelt

- De beginontwikkeling is goed, met een goed ontwikkelend gewas.
- Stikstof gift in meerdere doses is aan te raden.
- Het gebruik van Sencor is aan te bevelen voor opkomst. Na opkomst graag het lage doseringssysteem gebruiken.
- Hou een strak schema in uw Phytophthora bestrijding, Roslin is gevoelig voor Phytophthora in het loof.



Loofdoding en oogst

- Graag zorg dragen voor een goede en natuurlijke loofvernietiging.
- De knollen voor oogst goed laten afharden.
- Roslin is gevoelig voor stootblauw en mechanische beschadiging.
- Tijdens rooien en inschuren valhoogtes tot een minimum beperken.



Bewaring

- Start direct met drogen na de oogst, om condensatie te vermijden.
- Zorg voor goede droging en wondheling.
- Voorkom zilverschurft: zorg voor een constante bewaartemperatuur.
- Bij een lange bewaring is mechanische koeling vereist.



Agroplant stelt zich niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie..